

Pacientská organizácia pre chronické plúcne choroby




**abc**  
za zdravé dýchanie  
o. z.

## Sarkoidóza plúc informácie pre pacientov

# Sarkoidóza

**Sarkoidóza** je stav, kedy sa drobné uzlíky (granulómy) vytvárajú v rôznych častiach tela. Najčastejšie sú to plúca, ale sarkoidóza sa môže vyskytnúť v ktorejkoľvek časti tela. U väčšiny prípadov je priebeh ľahký a nevyžaduje žiadnu liečbu.



Obrázok: Obraz granulómu plúc v mikroskope

## Čo spôsobuje sarkoidózu?

Príčina sarkoidózy je neznáma. Ale keďže sa niekedy vyskytuje u viacerých príslušníkov tej istej rodiny, predpokladá sa možná genetická predispozícia. Predpokladá sa, že niektoré aj infekcie a faktory vonkajšieho prostredia môžu byť spôsobmi sarkoidózy. Ale doteraz žiadny mikroorganizmus ani faktor prostredia neboli definitívne potvrdené.


## U koho vzniká sarkoidóza?

Sarkoidóza je zriedkavé ochorenie. Najčastejšie sa vyskytuje u mladých ľudí medzi 20-40 rokom života, ale môže sa vyskytovať aj u mladších alebo starších ľudí. Je častejšia u Európanov ako Afričanov alebo Američanov.

## Ktorú časť tela sarkoidóza postihuje?

Sarkoidóza môže postihnúť takmer každú časť tela. A často postihuje naraz viaceré orgány tela.

- ✓ plúca a lymfatické uzliny v hrudníku sú postihnuté sarkoidózou najčastejšie. má ich 9 z 10 ľudí so sarkoidózou,
- ✓ postihnutie kože má 1 zo 4 ľudí,
- ✓ lymfatické uzliny na iných častiach tela ako v plúcach sa vyskytujú u 1 zo 6 ľudí,
- ✓ očné príznaky má 1 z 8 pacientov,
- ✓ postihnutie nervového systému nachádzame u 1 z 20 pacientov,
- ✓ postihnutie srdca je u 1 z 50 ľudí,
- ✓ sarkoidóza sa môže vyvinúť aj v iných častiach tela, ako sú kosti, črevá, svaly, pečeň, slezina, obličky.



Obrázok: Výskyt sarkoidózy v tele

## Ako sa sarkoidóza vyvíja?

Vôbec nemusíte vedieť, že máte sarkoidózu. Tá sa môže náhodne objaviť na rtg snímke hrudníka. Až polovica ľudí so sarkoidózou nemá žiadne symptómy. Niekoľko ľudí má symptómy objavujúce sa pomerne rýchlo s horúčkou, kašľom a podkožnými uzlami na predkolení. Tomu stavu hovoríme Lofgrenov syndróm alebo akútnej sarkoidóze. Všeobecne aj táto forma má tendenciu k rýchlemu ústupu aj bez liečby.

U iných ľudí môže sarkoidóza prebiehať pomaly počas niekolkých mesiacov. Symptómy sa postupne zhoršujú a táto forma vyžaduje liečbu.

## Aké sú symptómy sarkoidózy?

Symptómy sarkoidózy sa môžu lísiť od prípadu k prípadu. Je to spôsobené tým, že sarkoidóza môže postihovať rôzne orgány v tele. Môže byť postihnutý len jeden orgán (najčastejšie pluča), ale môže sa súčasne zistíť vo viacerých orgánoch tela.

- ✓ **pluča** – môže spôsobovať dýchaviciu, kašel, bolesť na hrudníku,
- ✓ **koža** – najčastejšie sa vyskytuje ako nodózny erytém – t.j. červené podkožné uzly na predkoleniach alebo predlaktiach, ktoré sa často vyskytujú na začiatku ochorenia,
- ✓ **lymfatické uzliny** – najčastejšie nachádzame zväčšené lymfatické uzliny v hrudníku, môžu sa však vyskytnúť aj v podpazuši alebo na krku,
- ✓ **oči** – sarkoidóza môže spôsobovať uveitídu oka. Prejavuje sa zápalom v oku so začervenaním a bolestivostou oka,
- ✓ **srdce** – sarkoidóza môže spôsobovať búšenie srdca, spomalenie alebo nepravidelnosť pulzu. Niekoľko ľudí môže vzniknúť kardiomyopatia, ktorá sa prejavuje zväčšením srdca,
- ✓ **nervový systém** – sarkoidóza môže postihovať nervy tváre, hlavy alebo ramien. To sa môže prejavovať problémami s hltaním, pohybom svalov tváre, očí, sluchovými problémami,
- ✓ **obličky** – sarkoidóza sa môže prejavovať vytvorením obličkových kameňov pre vyššiu hladinu kalcia v sére,

- ✓ **slezina a pečeň** – najčastejšie sa prejavuje zväčšením týchto orgánov. Zriedka sa môže vyskytnúť anémia,
- ✓ **kosti** – často sa vyskytujú cysty v kostiach, hlavne v malých kostiach rúk.

Všeobecnými prejavmi sarkoidózy sú horúčka, chudnutie, únava. U niektorých pacientov sa vyvinula depresia.

## Ako sa sarkoidóza diagnostikuje?

Základným diagnostickým vyšetrením je rtg snímka hrudníka. Ďalej sa robia krvné testy na vylúčenie anémie, zvýšenej hladiny kalcia v sére, obličkové a pečeňové testy, sarkoidózu potvrzuje špeciálne krvné vyšetrenie - SACE.



## Špeciálne diagnostické testy,

- ✓ **CT hrudníka** – je najcitlivejším vyšetrením na potvrdenie sarkoidózy v hrudníku,
- ✓ **Vyšetrenie difúznej kapacity plúc a bodypletyzmografie** – na zistenie postihnutia funkcie plúc,
- ✓ **Vyšetrenie očného pozadia** – na vylúčenie očných prejavov,
- ✓ **Ultrasonografia brucha** – na vylúčenie postihnutia orgánov dutiny brušnej,
- ✓ **Rtg rúk a nôh** – vylúčenie cystických zmien na malých kostiach rúk a nôh,
- ✓ **Bronchofibroskopia s bronchiálnou lavážou** – je indikovaná pri nejasnom náleze na CT hrudníka na potvrdenie diagnózy,
- ✓ **EKG** – na vylúčenie arytmie,
- ✓ **Biopsia s histologizáciou** – je indikovaná pri diagnostických nejasnostiach – napr. nejasných kožných procesoch alebo nejasných zväčšených lymfatických uzlinách. Pri tomto vyšetrení sa tenká ihla vpichne do postihnutého miesta a odoberie sa malá vzorka tkaniva, ktoré sa vyšetrí pod mikroskopom.

## Aká je liečba sarkoidózy?

Viac ako 75% prípadov sarkoidózy netreba liečiť, lebo sa prejavuje minimálne. V prípade potreby použitia medikácie je hlavným cieľom znížiť zápal a tým ovplyvniť symptómy ochorenia.

## Kortikosteroidy

Najčastejšie sa používajú v tabletovej forme. Pomáhajú znížiť zápalový proces v tele. Dĺžka liečby je zvyčajne 6-24 mesiacov. Následne sa dávkva kortikosteroidov postupne znižuje. Kortikosteroidy sa zvyčajne nasadzujú pri postihnutí nervového systému, srdca a očí, alebo ak je vysoká hladina kalcia v sére alebo výrazné plúcne postihnutie.

## **Iná medikácia**

Ak kortikosteroidy nemôžeme použiť pre vedľajšie účinky, alebo ak sú neefektívne, používame alternatívne lieky ako napr. cytostatiká alebo imunosupresíva. Tieto sa používajú samostatne, alebo v kombinácii s kortikosteroidmi na zníženie dávky kortikosteroidov.

## **Budem potrebovať ďalšie sledovanie po vyliečení?**

Po vyliečení sú pacienti dlhodobo sledovaní na Plúcnych ambulanciách. Dispenzárne kontroly sú zvyčajne raz ročne. Zvyčajne sa robí pneumologické vyšetrenie s rtg snímkou hrudníka a vyšetrením difúznej kapacity plúc. Iné vyšetrenia (napr. krvné testy, očné vyšetrenie a ďalšie) závisia od pôvodného postihnutia. U pacientov so sarkoidózou je doporučené očkovanie proti chrípke každý rok.

## **Aká je prognóza sarkoidózy?**

Prognóza sarkoidózy je zvyčajne dobrá. Viac ako 75% pacientov so sarkoidózou sa vylieči spontánne. Pri formách vyžadujúcich liečbu majú lepšiu prognózu ochorenia, kedy sú postihnuté len plúca. Najrýchlejšie na liečbu reaguje akúttna sarkoidóza s Lofgrenovým syndrómom. Len výnimočne sarkoidóza prechádza do chronicity. K relapsom sarkoidózy dochádza len ojedinele.

Spracovala: MUDr. Helena Horváthová

Zdroj: <https://patientinfo/health/sarcoidosis-leaflet - krátené>

Vydané s podporou Chiesi Slovakia s.r.o., 2018  
Elektronická verzia dostupná na [www.rozdychajto.sk](http://www.rozdychajto.sk)